

In der GP- Rasse, und zu einem gewissen Grad in den Mini, Immunreaktionen auf Impfstoff sind berichtet worden. Diese Reaktionen treten in einer Vielzahl von Symptomen auf und mit unterschiedlicher Intensität.

Da das Problem nicht allgemein bekannt ist unter Tierärzten oder Hundebesitzern, haben wir das Bedürfnis, Informationen über Symptome und angemessene Behandlung zu Verfügung zu stellen. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass, wenn Symptome auftreten, die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.

Symptome

Wenn eine Reaktion auftritt, es entwickelt sich meist nach der Impfung bei 12 Wochen Alter, wenn der Welpen in seine neue Familie umgezogen ist. Gesundheitliche Komplikationen nach der Impfung können sich auch bei einer früheren oder einer späteren Behandlungen zeigen . Die Reaktion ist ein Zeichen von Überreaktion des Immunsystems.

Typischerweise zeigen sich die Anzeichen für eine Reaktion 7-10 Tage nach der Impfung, die Zeit ist unterschiedlich. Die Symptome unterscheiden sich, von einer kleinen Ausbuchtung an der Injektionsstelle, zu Unruhe, Zittern, Krämpfe, Inkontinenz und im schlimmsten Fall Bewusstlosigkeit.

Behandlung

Die wichtigste und effektivste Behandlung ist mit Cortison, ergänzend durch Entspannung (vermutl. Beruhigungsmittel) unterstützt, wie in schweren Fällen Stesolid. Die entspannende Droge darf nicht als eine einzige Behandlung verwendet werden, nur in Verbindung mit Cortison! Der Patient darf niemals, unter keinen Umständen anästhesiert werden.

Das Cortison Behandlung wird verteilt, um die allergische Reaktion zu reduzieren und die eventuelle Verwendung einer entspannenden Substanz kann notwendig sein, um intensive Anfälle zu verringern. Wahlweise haben Hunden zusätzliche Behandlungen wie Vitamin B, Antibiotika oder Anti-Erbrechen Substanzen bekommen. Patienten, die die richtige Behandlung bekommen, sind in der Regel frei von Symptomen innerhalb von 36 Stunden.

Wichtig!

Eine Reihe von Welpen wurde eingeschlafert oder starb an falscher Behandlung, völlig umsonst, weil Tierärzte unwissend oder falsch informiert sind zu diesem Thema.

Die Links hier sind wertvolle Informationen. Kopieren und fügen Sie den Link in Ihren Browser

Artikel in der Svensk veterinärtidning (Swedish Veterinary Journal) nr 6 /2006:

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Svensk-veterinärtidning-nr-6-2006.pdf>

Artikel in der Finsk veterinärtidning (Finnisch Veterinary Journal Tabu) nr 1 /2005:

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Artikel-i-Finsk-veterinärtidning-Tabu-nr-1-20051.pdf>

"Vaksiner og vaksinasjons - komplikationer hos hund" (auf Norwegisch):

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Vaksiner-og-vaksinasjons-komplikasjoner-hos-hund.doc>

Post- Impf- Reaktionen in deutschen Pinscher

- Vorbericht

<http://www.pinschersektionen.se/wp-content/uploads/2013/04/Post-vaccinal-reactions-in-German-Pinschers>

- Vorläufigen Bericht. doc

Bitte :

- Benachrichtigen Sie die Zuchtausschuss über alle auftretenden Ereignisse Impfreaktion!

Hundebesitzer lesen Sie bitte:

- Achten Sie auf die Info oben und die unten aufgeführten Links mit Ihrem Tierarzt / Klinik zu teilen.
- Wenn vom Unglück getroffen und ein ungutes Gefühl mit Ihrem Tierarzt: sofort Kontakt mit Ihrem Züchter, der Sie in Ihren Kontakten unterstützt mit der behandelnden Klinik.
- Datum notieren, Marke und wenn möglich, Chargennummer des Impfstoffes für Ihren Hund und die leicht zugänglichen Informationen.
- Lassen Sie niemals anästhetische Behandlung in Verbindung mit einem Impfstoff Reaktion!

Tierärzte lesen Sie bitte:

- Vor der Behandlung, sollten Sie die Informationen oben und in den Links zur Verfügung haben.
- Wenn ein Hund kommt mit Symptomen, die auf eine allergische Reaktion auf einen Impfstoff verwandt sind, nicht anästhesieren den Patienten!
- Da eine sofortige Behandlung von Bedeutung sein kann, kontaktieren Sie bitte den Züchter, wenn Unsicherheiten auftreten sollten.
- Bitte melden Verdachtsfälle von Impfstoff-Reaktionen an den Zucht Ausschuss:
ak@pinschersektionen.se